

## Triticale: Sorten- und Intensitätsversuch

**Versuchsfrage:** Welche Sorten eignen sich für den Anbau in der Praxis und wie reagieren sie auf das ÖLN- bzw. Extenso-Verfahren?

Abk. + Nr.	Sorte	Arenenberg (Märstetten)	Liebegg (Gränichen)	Rütti (Zollikofen)	Strickhof (Lindau)	Wallierhof (Riedholz)	Vorgaben Anbau- und Versuchstechnik
WT-1	Triamant	X	X	X	X	X	<b>Versuchsanordnung:</b> Randomisierte Sortenstreifen, in der Hälfte unterteilt für die beiden Verfahren, am Standort Märstetten 2 Wiederholungen  <b>Verfahren:</b> <b>Extenso:</b> ca. 110 kg N/ha <b>ÖLN:</b> 1-2 Fungizide; Halmverkürzer; 30 kg N/ha mehr als Extenso  <b>Bonituren/Erhebungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lager gemäss Schema swiss granum inkl. Lagerbeginn</li> <li>• Krankheiten: alle die mindesten Note 3 erreichen</li> <li>• Rohertrag ungereinigt, Feuchtigkeit bei der Ernte, HLG, Protein, Fallzahl (Auswuchs), Abgang</li> <li>• Wirtschaftlichkeit</li> </ul> <b>Muster:</b> 5 kg je Sorte aus beiden Verfahren ans Niderfeld  <b>Auswertung / Publikation:</b> Paul Wirth
WT-2	Talentro	X	X	X	X	X	
WT-3	Dorena	X	X		X	X	
WT-4	Cosinus	X	X	X	X	X	
WT-Ref 1		X					
WT-Ref 2		X					
WT-Ref 3		X					
<b>Anzahl Sorten</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Anzahl Parzellen</b>		<b>22</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	